




ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืชอำเภอปากช่อง



เตือนการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓


สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่องเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ อำเภอเสิงสาง และอำเภอครบุรี โดยเชื้อสาเหตุสามารถติดมากับท่อนพันธุ์ และมีแมลงหริ่งขาวยาสูบ ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้ เป็นแมลงพาหะนำโรค

สาเหตุโรค เกิดจากเชื้อไวรัส *Sri Lankan cassava mosaic virus*

การแพร่ระบาดของโรค แพร่โดยติดไปกับท่อนพันธุ์ และแมลงหริ่งขาวยาสูบ เป็นพาหะนำโรค พืชอาศัยของแมลงหริ่งขาว ได้แก่ มันสำปะหลัง มันฝรั่ง กระเทียม หอม พริก

อาการเฉพาะของโรค พืชแสดงอาการใบด่างเหลือง ใบเสียรูปทรง และมีขนาดเล็กลง ยอดที่แตกใหม่แสดงอาการต่างเหลือง ลำต้นแคระแกรน

ความเสียหาย ทำให้ผลผลิตเสียหาย ๘๐ - ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์



แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันกำจัด

การสำรวจแปลง (โดยเกษตรกร)

แปลงปลูกใหม่ : ให้ตรวจสอบยอดที่แตกใหม่ว่ามีอาการต่างหรือไม่ ถ้าพบอาการใบด่างให้เก็บทำลายด้วยการฝังกลบ ถ้าไม่แน่ใจให้เกษตรกร แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันที และฉีดสารเคมีกำจัดแมลงหริ่งขาว เช่น imidacloprid ๗๐% WG หรือ thaimethoxam ๒๕% WG ในแปลงข้างเคียง

แปลงมันสำปะหลังที่โตแล้ว : ให้เดินสำรวจแปลงทุก ๒ สัปดาห์โดยตรวจสอบมันสำปะหลังทุกต้นในแปลง หากพบต้นที่แสดงอาการใบด่าง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หรือกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ หรือ แจ้งสายด่วนเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง โทร ๐๒-๕๕๕-๑๖๒๖ หรือ ๐๒-๕๕๕-๑๕๑๔ ทันที

แนวทางปฏิบัติสำหรับเกษตรกรหลังทำลายต้นมันสำปะหลังที่พบโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลง

๑. ให้หยุดปลูกมันสำปะหลัง อย่างน้อย ๒ เดือน หรือปลูกพืชอื่น เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียว ก่อนการปลูกมันสำปะหลังครั้งต่อไป ไม่ควรปลูกสับดำ ละหุ่ง และหม่อน ซึ่งเป็นพืชอาศัยของเชื้อไวรัสสาเหตุโรคใบด่างมันสำปะหลัง

๒. การใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค โดยใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร และงดใช้ท่อนพันธุ์ที่มาจากแหล่งปลูกที่มีประวัติพบการระบาดของโรคและท่อนพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

๑. สร้างการรับรู้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน/เกษตรกร ให้สามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง

๒. กรณีที่เกิดความเสียหาย ให้ความช่วยเหลือ เช่น การสนับสนุน หรือแนะนำแหล่งท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด การสนับสนุนศัตรูธรรมชาติหรือนับสนุนพ่อแม่พันธุ์ให้เกษตรกร ผลิตขยายเพิ่มปริมาณเพื่อช่วยลดปริมาณแมลงพาหะ


๓. ในกรณีที่เกิดความเสียหายสิ้นเชิง ดำเนินการตามขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง (โดยมีการประกาศเขตภัยพิบัติ)

มา : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง โทร ๐-๔๔๓๑๑๕๕๖ โทรสาร ๐-๔๔ ๓๑๖๗๗๐ หรือ <https://www.facebook.com/สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง> ในวันและเวลาราชการ



ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืชอำเภอปากช่อง



เตือนการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลาย

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่องเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด เป็นศัตรูสำคัญของข้าวโพด นอกจากนี้ยังมีพืชอาหารมากกว่า ๘๐ ชนิด เช่น ข้าว อ้อย ข้าวฟ่าง พืชตระกูลถั่ว มะเขือเทศ มันฝรั่ง ยาสูบ ฝ้าย ทานตะวัน ถั่วลิสง กระเทียม ขิง มันเทศ พริก พืชตระกูลกะหล่ำ พืชตระกูลแตง และพืชผัก

วงจรชีวิตของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ใช้เวลา ๓๐-๔๐ วัน เมื่อผสมพันธุ์แล้ว ด้สือเพศเมียจะวางไข่ในเวลากลางคืน โดยวางไข่เป็นกลุ่ม ประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ฟอง มีขนปกคลุมไข่ ด้สือเพศเมียหนึ่งตัววางไข่ได้ประมาณ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ ฟอง ระยะไข่ ๒-๓ วัน หนอนมี ๖ วัย ระยะหนอน ๑๔-๒๒ วัน หนอนที่โตเต็มที่มีขนาดลำตัวยาว ๓.๒-๔.๐ เซนติเมตร จะทิ้งตัวลงดินเพื่อเข้าดักแด้ ระยะดักแด้ ๗-๑๓ วัน จึงเป็นตัวเต็มวัย มีชีวิต ๑๐-๒๑ วัน สามารถบิน เคลื่อนย้ายระหว่างแปลง และอพยพระยะไกลระหว่างประเทศ หรือภูมิภาคได้



ดูแมวจับตัวในแปลง

ดูแมวจับตัวในแปลง

ดูแมวจับตัวในแปลง

แนวทางเฝ้าระวังและป้องกันกำจัด

การสำรวจแปลง (โดยเกษตรกร)

แปลงปลูกใหม่ : ควรหมั่นสำรวจแปลงหลังจากข้าวโพดงอก สังเกตกลุ่มไข่ และรอยทำลายสีขาวที่ผิวใบ เมื่อพบต้นถูกทำลาย จนมีรอยกัดขาดเป็นรู อย่งกันกำจัดตามคำแนะนำของสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เน้นพ่นสารลงในกรวยยอด โดยให้เดินสำรวจแปลงทุก ๒ สัปดาห์ หากพบ ันที่ถูกทำลาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หรือกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่

การป้องกันกำจัด

๑. เก็บกลุ่มไข่ หรือ ตัวหนอนทำลายทิ้ง ทำลาย ๑ กลุ่มไข่ เท่ากับทำลายหนอน ๑๐๐-๒๐๐ ตัว
๒. คลุกเมล็ดด้วยสารไซแอนทรานิลิโพรล ๒๐% เอสซี (กลุ่ม ๒๘) อัตรา ๒๐ ซีซี/เมล็ดพันธุ์ ๑ กิโลกรัม แล้วค่อยพ่นสารทางใบต่อเมื่อพบหนอนหรือการ ระบาด
๓. เมื่อพบหนอนขนาดเล็กที่เพิ่งฟักจากไข่ พ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ ได้แก่ เชื้อบีที สายพันธุ์ไอโซวา หรือ สายพันธุ์ โคเรสตาร์ก อัตรา ๘๐ กรัม/น้ำ ๒๐ ลิตร นทุก ๔-๗ วันหรือ ใช้แมลงตัวห้ำ เช่น แมลงหางหนีบ หรือ มวนเพศเมีย หรือ มวนพิฆาต
๔. ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง พ่นทางใบ อีมาเมคตินเบนโซเอท ๕% WG อัตรา ๑๐ กรัม ต่อ น้ำ ๒๐ ลิตร (กลุ่ม ๒) สไปนีโทแรม ๑๒% SC อัตรา ๒๐ มิลลิกรัม ต่อ น้ำ ๒๐ ลิตร (กลุ่ม ๕)


การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

๑. สร้างการรับรู้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน/เกษตรกร ให้สามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง
๒. กรณีที่เกิดความเสียหาย ให้ความช่วยเหลือ เช่น การสนับสนุน การสนับสนุนศัตรูธรรมชาติหรือสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์ให้เกษตรกร ผลิตขยายเพิ่มปริมาณ ื่อช่วยลดปริมาณแมลงศัตรู
๓. ในกรณีที่เกิดความเสียหายสิ้นเชิง ดำเนินการตามขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง (โดยมีการประกาศเขตภัยพิบัติ)

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย โทร ๐-๔๔๓๑๕๕๖ โทรสาร ๐-๔๔ ๓๑๖๗๗๐ หรือ <https://www.facebook.com/สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง> ในวันและเวลาราชการ



ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืชอำเภอปากช่อง



เตือนการระบาดของโรคโคนเน่าหัวเน่ามันสำปะหลังช่วงฤดูฝน

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่องเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโคนเน่าหัวเน่ามันสำปะหลังช่วงฤดูฝนเนื่องจากในช่วงนี้หลายพื้นที่ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง สภาพแวดล้อมดังกล่าวเหมาะต่อการระบาดของโรคโคนเน่าหัวเน่ามันสำปะหลังขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ

สาเหตุโรค เกิดจากเชื้อเชื้อรา

การแพร่ระบาดของโรค ในพื้นที่ฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง ระบายน้ำไม่ดี เป็นพื้นที่ดินดาน

อาการเฉพาะของโรค ต้นมันสำปะหลัง ส่วนที่อยู่เหนือดินจะพบอาการใบเหลือง เหี่ยว และร่วง โคนต้นแสดงอาการเน่าเป็นสีน้ำตาลหรือดำ บางพันธุ์ เช่น พันธุ์ห้วยบง ๖๐ พบอาการโคนต้นบริเวณคอดินแตก เมื่อขุดดูพบหัวมันสำปะหลังเน่า ผ่าดูภายในเป็นสีน้ำตาล หากอาการรุนแรงไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

ความเสียหาย ทำให้ผลผลิตเสียหาย ๘๐ - ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์



แนวทางป้องกันกำจัด

๑. แปลงปลูกควรยกทรง เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง

๒. คัดเลือกท่อนพันธุ์จากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรค

๓. หากพื้นที่ปลูกเป็นดินดานควรไถระเบิดชั้นดินดานและตากดินไว้ อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ก่อนปลูก

๔. ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเมทาแลกซิล ๒๕% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๒๐-๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร เป็นเวลา ๑๐ นาที

๕. ควรจัดระยะปลูกให้เหมาะสม เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะต่อการระบาดของโรค

๖. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบต้นที่แสดงอาการของโรค ถอนนำไปทำลายนอกแปลงปลูกแล้วโรยปูนขาว หรือราดด้วยสารเมทาแลกซิล ๒๕% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๒๐-๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร บริเวณที่ถอนและโดยรอบห่างออกไปประมาณ ๑ เมตร

๗. ควรทำความสะอาดเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในแปลงที่เป็นโรค เนื่องจากเชื้อสาเหตุโรคอาจติดมากับเครื่องจักรกลการเกษตรนั้น

๘. ในแปลงที่มีการระบาดของโรครุนแรง ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เช่น อ้อย ข้าวโพด หรือพืชตระกูลถั่ว


**** ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรครุนแรง ควรปฏิบัติดังนี้ ๑. พื้นที่ที่พบต้นแสดงอาการของโรคร้อยละ ๕๐ ควรไถทิ้ง เก็บเศษซากนำไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วตากดิน ๒. พื้นที่ที่พบต้นแสดงอาการของโรคร้อยละ ๓๐-๕๐ - มันสำปะหลังอายุ ๑-๓ เดือน ควรไถทิ้ง เก็บเศษซากนำไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วตากดิน มันสำปะหลังอายุ ๔-๗ เดือน หว่านปูนขาวให้ทั่วแปลง และควรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทันที มันสำปะหลังอายุ ๘ เดือนขึ้นไป ควรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทันที

ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง โทร ๐-๔๕๓๑๑๕๕๖ โทรสาร ๐-๔๔ ๓๓๖๗๗๐ หรือ <https://www.facebook.com/สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง> ในวันและเวลาราชการ



ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืชอำเภอปากช่อง



มาตรการจำกัดการใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่องแจ้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล พืชไร่ และไม้ดอก ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่วันที่มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕ เรื่อง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ต้องผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากรายงานในระบบจำกัดการใช้สารเคมีทั่วประเทศ

แนวทางบริหารจัดการ"พาราควอต" และ"คลอร์ไพริฟอส"เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.๒๕๖๓ ฝ่าฝืนโทษ จำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายที่ ๔ ใบทะเบียน ใบอนุญาตผลิตและใบอนุญาตครอบครองซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ จะสิ้นสุดทันที ผู้มี พาราควอต และ"คลอร์ไพริฟอส"ไว้ในครอบครองก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของกรมวิชาการเกษตรดังนี้

เกษตรกร ส่งคืนให้ร้านที่ซื้อภายใน ๙๐ วัน (ไม่เกิน ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ร้านค้า ส่งคืนผู้ผลิตหรือนำเข้าและแจ้งปริมาณต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ภายใน ๑๒๐ วัน (ไม่เกิน ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ผู้ผลิตและผู้นำเข้า กำหนดวัน วิธีและสถานที่ทำลายให้ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการทำลาย แจ้งปริมาณต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรภายใน ๒๗๐ วัน (ไม่เกิน วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

แนวทางการบริหารจัดการ พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส
เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ (วอ.๔) เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ห้าม บด ปั่น ผ่า สกัด ร่อน กรอง บำบัด โขลก จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ใบทะเบียน ใบอนุญาตผลิต และใบอนุญาตครอบครอง ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 จะสิ้นสุดทันที

ผู้มีพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ไว้ในครอบครองก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้

เกษตรกร	ร้านค้า	ผู้ผลิตและผู้นำเข้า
ส่งคืนให้ร้านที่ซื้อภายใน 90 วัน (วันที่ 20 ตุลาคม 2563)	ส่งคืนผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า และแจ้งปริมาณต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 120 วัน (วันที่ 20 ธันวาคม 2563)	แจ้งปริมาณต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรภายใน 270 วัน (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564)
กำหนดวัน วิธี และสถานที่ในการทำลายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการทำลาย		

กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และพาณิชย์

เกษตรกร โปรดทราบ...

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 พาราควอต คลอร์ไพริฟอส จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (วอ. 4) ห้ามประกาศกระทรวงมหาดไทย

ห้าม ผลิต/นำเข้า/ส่งออก/ครอบครอง

ฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ครอบครองต้องดำเนินการ ตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร

เกษตรกรผู้ใช้	ผู้ขาย/ร้านค้า	ผู้นำเข้า/ผู้ผลิต
ส่งมอบคืนร้านค้าจำหน่ายภายใน 29 สิงหาคม 2563	ส่งมอบคืนผู้ผลิต/ผู้นำเข้าภายใน 8 กันยายน 2563	แจ้งปริมาณ/แผนการทำลายให้กรมวิชาการเกษตรภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2564

กระทรวงการมหาดไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง โทร ๐-๔๔๓๑๑๕๕๖ โทรสาร ๐-๔๔ ๓๑๖๗๗๐ หรือ <https://www.facebook.com/สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง> ในวันและเวลาราชการ